

Số: 01/HD-TrKTNN/ĐH

Hưng Yên, ngày 09 tháng 01 năm 2026

HƯỚNG DẪN
Các biện pháp kỹ thuật bảo vệ sản xuất vụ Xuân năm 2026

Qua theo dõi của Trạm kỹ thuật nông nghiệp khu vực Đông Hưng, nông dân các địa phương đã và đang gieo mạ Xuân năm 2026. Trà mạ Xuân dài ngày mạ được đặt từ 3,5-4,5 lá, mạ khay đặt từ 2-2,5 lá. Diện tích mạ được ngăn ngày che phủ nilon dự kiến sẽ gieo tập trung xung quanh 20/1/2026.

Để hạn chế ảnh hưởng của điều kiện thời tiết bất thuận cũng như các đối tượng dịch hại, Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực Đông Hưng hướng dẫn các địa phương một số biện pháp kỹ thuật như sau:

1. Đối với diện tích mạ Xuân

- Mạ gieo cần che phủ nilon và đảm bảo đủ nước khi nhiệt độ dưới 15°C. Khi nhiệt độ trên 15°C, trời có nắng, có gió đông cần mở hai đầu luống và vén dần hai bên luống tránh tình trạng bung kín nilon gây thối hỏng mạ; trước khi đưa mạ ra cấy từ 5-7 ngày cần mở dần nilon để mạ thích ứng với thời tiết.

- Hướng dẫn nông dân kiểm tra đồng ruộng và phun phòng một số đối tượng sâu bệnh hại trước khi đưa mạ ra cấy từ 5-7 ngày.

+ Đối với sâu đục thân hai chấm phun trừ khi mật độ ổ trứng trên mạ từ 0,3 ổ/m² trở lên.

Thuốc phòng trừ sâu đục thân hai chấm: Khuyến cáo nên dùng một trong các loại thuốc như INCIPIO 200SC, Chlorferan 240SC(Vua đục thân),...

+ Đối với rầy các loại: Để hạn chế bệnh lùn sọc đen khuyến cáo phun phòng rầy cho mạ để hạn chế môi giới truyền bệnh.

Thuốc phòng trừ rầy: Khuyến cáo nên dùng một trong các loại thuốc như Actara 25WG, Chess 50WG; Oshin 20WP,...

+ Đối với bệnh đạo ôn lá. Kiểm tra phun phòng khi tỷ lệ bệnh trên 5% tập trung trên các giống lúa nhiễm như TBR225, BC15, Q5, Nếp các loại, ...

Thuốc phòng bệnh đạo ôn: Filia 525SE, Bump 650WP, BEAM 75WP,...

Lưu ý: Liều lượng, nồng độ theo hướng dẫn trên bao bì của Nhà sản xuất.

- Với những diện tích mạ khay, mạ sân cần lưu ý sử dụng thuốc phòng trừ nấm, vi khuẩn, chế phẩm kích thích rễ như KH, Pennac P,...để hạn chế hiện tượng chết chòm trên mạ.

- Tuyên truyền cho người nông dân không nên gieo cấy khi nhiệt độ dưới 15⁰C, chú ý đảm bảo 5% lượng mạ dự phòng.

2. Công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Xuân năm 2026

a. Vệ sinh đồng ruộng:

Dọn sạch tàn dư thực vật, cỏ bờ ruộng, bờ mương, bờ máng để hạn chế nơi cư trú của chuột.

b. Biện pháp diệt chuột: Công tác diệt chuột muốn đạt hiệu quả cao cần kết hợp nhiều biện pháp:

* Diệt chuột bằng biện pháp thủ công và sinh học:

- Dùng đèn sáng để soi, kết hợp với gậy, vợt để đánh chuột.

- Bảo vệ các loài thiên địch của chuột như mèo, rắn, chim cú mèo,...

- Sử dụng các loại chế phẩm sinh học, bả diệt chuột sinh học để diệt chuột.

* Biện pháp hóa học:

+ Đợt 1: Ngay sau khi đổ ải để đạt hiệu quả nhất cần tập trung đặt thuốc, bả trên vùng trồng lúa, bờ mương, bờ máng, ven đê, bờ vùng, bờ thửa, gò đồng, ven khu công nghiệp. Thời gian tập trung từ cuối tháng 1/2026 đến 15/2/2026.

+ Đợt 2: Đặt bả thuốc trừ chuột từ giai đoạn sau cấy đến khi lúa đẻ nhánh-đứng cái, nơi mật độ chuột còn cao sau khi đặt bả đợt 1, kết hợp với biện pháp thủ công đặt bẫy bán nguyệt. Thời gian từ 1-31/3/2026. Sử dụng mồi diệt chuột là thóc luộc nứt vỏ trấu để ráo, mọng mạ,...trộn với các loại thuốc theo tỷ lệ khuyến cáo trên bao bì các loại thuốc sử dụng.

Lưu ý: Đánh chuột cần đảm bảo đúng kỹ thuật, an toàn vệ sinh môi trường, nghiêm cấm dùng điện và dùng thuốc không có trong danh mục thuốc BVTV để diệt chuột.

Trên đây là hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật bảo vệ sản xuất vụ Xuân năm 2026 đề nghị UBND các xã, HTX chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền cho các hộ nông dân nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Trung tâm Nước và KTNN;
- UBND các xã;
- Các Hợp tác xã,
- Lưu trạm./.



TRAM TRƯỜNG

Vũ Thị Nhuệ